

RIKS-STROKE - TIA

Personnummer

Kön 1= man 2= kvinna

Namn

Adress*

Telefon*

Valfri uppgift* (ex. namn och telefon till närstående eller annat)

.....
* Adress, adress, telefon och valfri uppgift anges endast på pappersformulär och ska inte registreras elektroniskt i registret.

Insjuknandedag

G 45 = TIA/cerebral ischemi/övergående inom 24 timmar
(G45.4 transitorisk global amnesi registreras ej)

G

EVENTUELL TIA-DIAGNOS EFTER TROMBOLYSBEHANDLING REGISTRERAS I FORMULÄRET FÖR STROKE I AKUTSKEDET

----- VÅRDKEDJA -----

Rapporterande sjukhus

Avdelning

Ifyllt av (namn på person som fyller i formuläret)

Hemkommunkod vid insjuknandet (Fylls i automatiskt i reg.modulen)

Hemlänskod vid insjuknandet (Fylls i automatiskt i reg.modulen)

Har patienten vårdats ineliggande för detta TIA-insjuknande?

1= ja, gäller även redan ineliggande vid insjuknandet 2= nej

Kom patienten med ambulans? 1= ja 2= nej 9= okänt

Antal timmar från insjuknandet till ankomst till sjukhus

Om patienten vaknat med symtom anges senaste tid utan symtom

1= ≤ 3 tim 2= ≤ 4,5 tim 3= ≤ 24 tim 4= > 24 tim 9= okänt

A Ankomstdag

A Utskrivningsdag

----- RISKFAKTORER -----

Svarsalternativ 1= ja 2= nej 9= okänt

Stroke tidigare

TIA/ Amaurosis fugax tidigare?

(Gäller ej G45.4 transitorisk global amnesi)

Förmaksflimmer, tidigare diagnostiserad

(Gäller även intermittent flimmer eller fladder)

Förmaksflimmer, nyupptäckt

(Gäller även intermittent flimmer eller fladder)

Rökning (\geq en cigarett/dag, eller slutat under de senaste 3 mån)

----- ABCD2 score -----

ABCD2 score är endast ett prognostiskt score och har ingen annan funktion. Fyll i svarsalternativets siffra!

Ålder

1= \geq 60 år

0= <60 år

Blodtryck

1= \geq 140/90 vid undersökningen

0= <140/90 vid undersökningen

Klinisk bild under aktuell TIA

(TIA kan yttra sig med många olika symtom. ABCD2-score efterfrågar enbart två symtomgrupper)

1= talsvärigheter utan svaghet

2= svaghet i ena sidan (unilateral) kan vara i kombination med andra symtom

0= övriga symtom

Symtomens varaktighet

1= symtom varat 10-59 minuter

2= symtom varat \geq 60 minuter

0= symtom varat < 10 minuter

Diabetes

1= diabetes, tidigare diagnosticerad eller nyupptäckt

0= ingen diabetes

----- AKUTVÅRD/DIAGNOSTIK -----

Datortomografi hjärna under akutskedet (inom 7 dagar efter insjuknandet)

1= ja 2= nej 9= okänt

MR hjärna under akutskedet (inom 7 dagar efter insjuknandet)

1= ja 2= nej 9= okänt

Om ja, MR hjärna under akutskedet:

1= visar färsk hjärninfarkt 2= visar ingen färsk hjärninfarkt 9= osäkert eller okänt undersökningsfynd

Ultraljud halskärl genomförd

= ja, inom 7 dagar efter eller inom en månad före insjuknandet

= ja, senare än 7 dagar

= nej

= okänt

CT- angio genomförd

= ja, inom 7 dagar efter eller inom en månad före insjuknandet

= ja, senare än 7 dagar

= nej

= okänt

MR-angio genomförd

= ja, inom 7 dagar efter eller inom en månad före insjuknandet

= ja, senare än 7 dagar

= nej

= okänt

Undersökt kärlområde med CT- eller MR-angiografi (fråga alltid läkare vid osäkerhet om kärlområde)

= halskärlen

= intrakraniella kärl

= både halskärl och intrakraniella kärl

= okänt

Långtids-EKG (telemetri, Holter eller motsvarande) genomförd under vårdtiden

= ja

= nej, beställt till efter utskrivningen

= nej

= okänt

Är bedömning av arbetsterapeut gjord? 1= ja 2= nej 9= okänt

Är bedömning av sjukgymnast gjord? 1= ja 2= nej 9= okänt

----- LÄKEMEDELSBEHANDLING -----

se även **FASS, Vägledning** och **läkemedelslista**

Svarsalternativ 1= ja 2= nej 3= nej, planerad insättning vid ÅB inom 2 v efter utskrivning 9= okänt

	Vid insjuknandet	Vid utskrivningen*
Blodtryckssänkande läkemedel (avser samtliga grupper oberoende av indikation)	_ _	_ _
Statiner (t ex Crestor, Lipitor, Pravastatin, Simvastatin, Zocord)	_ _	_ _
ASA (t ex Trombyl)	_ _	_ _
Clopidogrel (Plavix)	_ _	_ _
ASA + dipyridamol (Asasantin)	_ _	_ _
Dipyridamol (Persantin)	_ _	_ _
Andra trombocythämmare än ASA, clopidogrel och dipyradimol (t ex Brilique, Efient, Pletal, Possia)	_ _	_ _
Warfarin (Waran)	_ _	_ _
Andra perorala antikoagulantia än Warfarin (t ex Eliquis, Pradaxa och Xarelto)	_ _	_ _
Huvudorsak varför warfarin eller andra perorala antikoagulantia än Warfarin ej är insatt vid utskrivning vid förmaksflimmer och diagnos G 45		_ _
1= planerad insättning efter utskrivning 2= kontraindicerat (enl. FASS) 3= interaktioner med andra läkemedel/naturläkemedel (enl. FASS) 4= försiktighet (enl. FASS) 5= falltendens 6= demens 7= patienten avstår behandling 8= annan anledning 9= okänt		
Förskrivning av FaR (fysisk aktivitet på recept)?		_ _
1= ja 2= nej 3= nej, behovet av fysisk aktivitet är redan tillgodosett 9= okänt		

----- INFORMATION och UPPFÖLJNING -----

Information om rökstopp till de som är rökare vid insjuknandet	_ _
1= ja 2= nej 3= ej relevant p g a patientens tillstånd 9= okänt	
Information given om bilkörning	_ _
1= ja 2= nej 3= ej relevant/saknar körkort 9= okänt	

Är ett återbesök på grund av det aktuella TIA-insjuknandet planerat hos sjuksköterska eller läkare (flera svarsalternativ möjliga)

|_|_| = ja, på särskild strokemottagning (på eller utanför sjukhuset)

|_|_| = ja, på annan sjukhusmottagning/avdelning

|_|_| = ja, på vårdcentral/motsvarande

|_|_| = ja, på särskilt boende

|_|_| = nej

|_|_| = okänt